



คลินิกโรคลมชัก

กับ งานบริหารทางเภสัชกรรม



ผู้ป่วยโรคลมชักเป็นผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งที่พบว่า มีปัญหาจากการใช้ยา ค่อนข้างสูง โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากพยาธิสภาพของโรคที่อาจส่งผลต่อความจำของผู้ป่วย จำนวนรายการยากันชักที่ใช้ในการรักษา รวมไปถึงยารักษาโรคประจำตัวและยาอื่นๆ ของผู้ป่วยที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหากับยากันชักได้ เช่น การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากันชักและยาอื่น ความไม่เข้าใจในวิธีการรับประทานยากันชักของผู้ป่วย การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยากันชัก สาเหตุต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยาในที่สุด



สำหรับคลินิกโรคลมชักนั้น เภสัชกรได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลผู้ป่วยโรคลมชักร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ปัจจุบันให้บริการผู้ป่วยประมาณ 250 รายต่อเดือน โดยผู้ป่วยที่ยังมีอาการชักอยู่จะพบเภสัชกรก่อนพบแพทย์ เภสัชกรจะทำหน้าที่ประเมินและคัดกรองปัญหาการใช้ยากันชักของผู้ป่วยด้วยการซักประวัติ การรับประทานยา รวมถึงอาหารเสริมและสมุนไพรอื่นๆ สรุปปัญหาที่พบเสนอแนวทางป้องกัน และการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งต่อไปยังทีมรักษาผ่านการเขียน Pharmacist Note ลงในแบบฟอร์มของคลินิกโรคลมชัก ปัญหาที่พบบ่อยที่สุด คือ ผู้ป่วยรับประทานยากันชักไม่ถูกต้อง ซึ่งมักเกิดจากความไม่เข้าใจของตัวผู้ป่วยเอง เมื่อแพทย์มีการปรับขนาดยา ดังนั้นผู้ป่วยกลุ่มนี้จะได้รับคำแนะนำการใช้ยาและการปฏิบัติตัวจากเภสัชกรอีกครั้ง หลังพบแพทย์ บางกรณีผู้ป่วยไม่ได้นำยากันชักที่รับประทานอยู่มาด้วย ทำให้การสื่อสารเรื่องยาทำได้ยากขึ้นและใช้เวลานาน กล้องแสดงตัวอย่างยากันชักจึงเป็นนวัตกรรมที่ทีมเภสัชกรคลินิกโรคลมชัก ร่วมกับมูลนิธิเทียนส่องใจ เพื่อคนไข้โรคลมชักได้จัดทำขึ้นมา เพื่อช่วยให้การสื่อสารเรื่องยากันชักกับผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างยิ่งขึ้น

คลินิกโรคลมชัก

เปิดบริการ
ทุกวันจันทร์ และอังคารบ่าย
ในส่วนของเภสัชกรได้เริ่มให้บริการตั้งแต่
เวลา 12.30 น. - 16.00 น.
ณ ห้องสอนแสดง อาคาร กปร ชั้น 3